

21 февраля - День профилактики инфекций, передающихся половым путем (ИППП).

Правила безопасного сексуального поведения.

Правило 1. Воздержание от сексуальных контактов - это не повод для насмешек и не патология, а всего лишь время на размышление и принятие решения. Предпринимать какие-либо действия можно, лишь будучи полностью уверенным в своем решении.

Правило 2. Секс - не единственная возможность проявления любви. До определенного времени чувства могут выражаться через ухаживание, поцелуи, объятия, взаимные ласки и пр. Пока нет уверенности в полной безопасности, лучше избегать сексуальных контактов.

Правило 3. Чтобы предотвратить инфицирование ВИЧ, нужно сохранять верность одному партнеру. Чтобы избежать взаимного недоверия - правило 4.

Правило 4. Прежде чем вступать в сексуальные отношения, обоим партнерам следует сдать анализы на ИППП, включая ВИЧ/СПИД.

Правило 5. Необходимо применять презервативы при каждом сексуальном контакте, соблюдая правила их покупки и использования. Только в этом случае можно рассчитывать на эффективную защиту от ВИЧ.

Куда обращаться?

УЗ «Витебский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии» адрес *ул. Б. Хмельницкого, 9, 210015, г. Витебск,*

Интернет-сайт: www.vokcdk.by

Отделение анонимной диагностики урогенитальных заболеваний Витебского областного клинического центра дерматовенерологии и косметологии *работает по адресу ул. Герцена, ба.*

Консультации пациентов по проблемам инфекций, передаваемых половым путем:
рабочие дни: 09.00-13.00, 16.45-18.00, суббота с 09.00 – до 11.00

Каждый желающий может получить ответы на все интересующие его вопросы по постоянно действующему телефону доверия, ежедневно с 13.00 до 15.00 по телефону 48-81-42 на вопросы отвечают высококвалифицированные специалисты.

ИНФЕКЦИИ ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ



ЕЖЕГОДНО

448 000 000

НОВЫХ СЛУЧАЕВ ИЗЛЕЧИМЫХ ИППП

СИФИЛИС, ГОНОРЕЯ, ХЛАМИДИОЗ И ТРИХОМОНИАЗ



15-49 ЛЕТ

ИППП ЯВЛЯЮТСЯ
ОСНОВНОЙ ПРЕДОТВРАТИМОЙ
ПРИЧИНОЙ БЕСПЛОДИЯ,
ОСОБЕННО У ЖЕНЩИН.



ПРИ ОТСУТСТВИИ ЛЕЧЕНИЯ
ИППП МОГУТ ИМЕТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ
РЕПРОДУКТИВНОГО
ЗДОРОВЬЯ И ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
МАТЕРИ И РЕБЕНКА.

ОСНОВНЫМ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ ВЕНЕРИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОВОЙ, НО ПРИ НЕКОТОРЫХ ИНФЕКЦИЯХ ВОЗМОЖНЫ И ДРУГИЕ ПУТИ ПЕРЕДАЧИ: КОНТАКТНО-БЫТОВОЙ, ВНУТРИУТРОБНЫЙ, ЧЕРЕЗ КРОВЬ.

ПЕРВЫМИ ПРИЗНАКАМИ ИНФЕКЦИИ МОГУТ БЫТЬ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ МОЧЕПОЛОВЫХ ПУТЕЙ, ЯЗВОЧКИ, ПОКРАСНЕНИЯ, ПУЗЫРЬКИ, МИКРОТРЕЩИНЫ НА КОЖЕ ИЛИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ, ЗУД ИЛИ ЖУЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ МОЧЕИСПУСКАНИЯ ИЛИ ПОЛОВОГО КОНТАКТА.



ВАЖНО ОТМЕТИТЬ! ПРИ ИНФЕКЦИЯХ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, **НЕ ПРОИСХОДИТ САМОИЗЛЕЧЕНИЯ** ОРГАНИЗМА. ЕСЛИ ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ СИМПТОМЫ ИСЧЕЗАЮТ – ЭТОГО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ ПЕРЕХОДА ЗАБОЛЕВАНИЯ В СКРЫТУЮ ФОРМУ.



КОМУ НЕОБХОДИМО СДАТЬ АНАЛИЗЫ?

ЛЮБОМУ ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРЫЙ ХОТЯ БЫ РАЗ В ЖИЗНИ ВСТУПАЛ В НЕЗАЩИЩЕННЫЙ КОНТАКТ БЕЗ ПРЕЗЕРВАТИВА



ИНФИЦИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫМИ ТИПАМИ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ К РАЗВИТИЮ РАКА ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ, В ЧАСТНОСТИ, РАКА ШЕЙКИ МАТКИ У ЖЕНЩИН.



НАДЕЖНЫМИ МЕРАМИ ПРОФИЛАКТИКИ ИППП ЯВЛЯЮТСЯ ВОЗДЕРЖАНИЕ ОТ ПОЛОВЫХ КОНТАКТОВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕЗЕРВАТИВА ПРИ КАЖДОМ ПОЛОВОМ КОНТАКТЕ И РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ИППП.

АНФ

AIDS HEALTHCARE
FOUNDATION

dance



life